

Tiibetinspanieleiden terveys- ja käyttäytymiskysely 2019

Osa I Hyvinvointi, koko ja käyttäytyminen

Terveys- ja käyttäytymiskyselyyn oli mahdollista vastata tammikuusta toukokuun loppuun. Kyselyyn vastaaminen ei edellyttänyt Tiibetinspanielit ry:n jäsenyyttä. Kyselyyn tuli yhteensä 314 vastausta. Seuraavissa tuloksissa on aina ilmoitettu, kuinka monta vastausta kuhunkin kysymykseen on tullut.

Terveys- ja käyttäytymiskyselyn avulla kerättiin tietoa tiibetinspanieleiden terveydestä, sairauksista ja rakenteellisista vioista. Kyselyssä kartoitettiin myös omistajien näkemyksiä rodun käyttäytymisen piirteistä. Jalostustoimikunta käyttää tietoja rodun terveystilanteen kartoittamiseen ja siten perinnöllisten sairauksien vastustamiseen ja jalostuksen tavoiteohjelman laatimiseen. Koirakohtaisia tietoja ei julkaista, vaan tulokset julkaistaan yhteenvetoina. Ensimmäisessä osassa Tiibetinspanieli 3-2019 -lehdessä julkaistiin Hyvinvointi, koko ja käyttäytyminen ja toisessa osassa lehdessä 4-2019 Silmien ja hampaiden terveys. Kolmas osa Tulehdussairaudet, luusto, muut perinnölliset/synnyttäiset sairaudet ja neljäs osa Lisääntyminen julkaistaan vuoden 2020 Tiibetinspanieli-lehdissä.


Tiibetinspanieleiden sukupuolijakauma kyselyssä

314 vastausta

Kyselyssä oli mukana tiibetinspanielinarttuja 182 (58 %) ja -uroksia 132 (42 %).

Oma arvio koiran kuntoluokasta


313 vastausta



Kyselyn tiibetinspanieleista oli normaalipainoisia oli 273, ylipainoisia 33 ja alipainoisia tai laihoja 7.

Koiran terveydentila

313 vastausta




Kyselyn tiibetinspanieleista lukumäärältään erinomainen terveydentila arvioitiin olevan 188 tiibetinspanielilla, hyvä 88 tiibetinspanielilla, melko hyvä 19 tiibetinspanielilla, tyydyttävä 15 tiibetinspanielilla ja heikko 7 tiibetinspanielilla.

Tiibetinspanieleiden säkäkorkeus kyselyssä


52 vastausta

Korkeus oli ilmoitettu 34 vastauksessa senttimetreinä. Kahdessa vastauksessa arvio oli keskikokoinen, yhdessä arvio oli alle keskikokoon. 15 vastauksessa oli ilmoitettu, että korkeutta ei ollut mitattu.



Tiibetinspanieleiden paino

303 vastausta




Painolla ja kuntoluokalla ei ollut yhteyttä: ylipainoisia tai lihavia oli myös keskikokoisissa, ja painoltaan suurimmissa oli kuntoluokaltaan normaaleja.

Laumassa vai ainoana koirana?

Koira

309 vastausta




Kyselyn tiibetinspanieleista 77 elää ainoana koirana ja 232 kahden tai useamman koiran laumassa.

Luonteen tai käyttäytymisen testaus

Onko koiran luonne testattu/MH-kuvattu

299 vastausta




Kyselyn tiibetinspanieleista 12 (4%) koiran luonne oli testattu tai MH-kuvattu. Luonnetestin pistemäärät vaihtelivat -12 pisteestä 140 pisteeseen, yhden luonnetesti oli keskeytetty päälle jääneen pelon vuoksi (0 p.).


Tiibetinspanielin käyttäytyminen ja luonne

237 vastausta laumassa elävien tiibetinspanieleiden osalta, ja 79 ainoana koirana elävien osalta.

Koira elää kahden tai useamman koiran laumassa



Koira elää ainoana koirana



Tiibetinspanielin sosiaalinen käyttäytyminen

Eniten valittu vastausvaihtoehto on painettu tummemmalla värillä. Kysymys osoittautui haastavaksi vastattavaksi kysymysasettelun vuoksi, joten lukumäärissä on pieni virhemarginaali.

Sosiaalinen käyttäytyminen/ vastausten lkm	Koira elää kahden tai useamman koiran laumassa			
	<i>Aina</i>	<i>Usein</i>	<i>Joskus</i>	<i>Ei koskaan</i>
Koira on kiltti ja ystävällinen oman perheen jäsenille.	222	10	0	0
Murisee oman perheen jäsenille.	0	0	24	178
Puree oman perheen jäseniä.	0	0	4	197
Suhtautuu avoimesti ja ystävällisesti vieraisiin ihmisiin.	138	54	32	3
Suhtautuu pidättyvästi mutta ystävällisesti vieraisiin ihmisiin.	33	36	45	89
On aggressiivinen vieraille ihmisille.	0	0	8	192
Suhtautuu ystävällisesti kaikkiin koiriin.	93	86	39	7
Suhtautuu aggressiivisesti omaa sukupuoltaan oleviin koiriin.	5	16	61	122
Suhtautuu aggressiivisesti kaikkiin koiriin.	2	6	47	147
Sopeutuu nopeasti uusiin tilanteisiin.	144	66	15	5
Palautuu hitaasti ennalleen yllättävien tilanteiden jälkeen.	18	32	45	113
Laumakäyttäytyminen: sopeutuu helposti laumaan.	177	45	4	5
Ongelmia hoitotoimenpiteissä kotona kuten kynsien leikkaamisessa.	8	18	53	128
Ongelmia eläinlääkärin normaaleissa hoitotoimenpiteissä (ei koske kiputiloja).	4	5	13	184

Sosiaalinen käyttäytyminen/ vastausten lkm	Koira elää ainoana koirana			
	<i>Aina</i>	<i>Usein</i>	<i>Joskus</i>	<i>Ei koskaan</i>
Koira on kiltti ja ystävällinen oman perheen jäsenille.	78	8	0	1
Murisee oman perheen jäsenille.	1	2	15	58
Puree oman perheen jäseniä.	0	0	8	66
Suhtautuu avoimesti ja ystävällisesti vieraisiin ihmisiin.	47	26	9	4
Suhtautuu pidättyvästi mutta ystävällisesti vieraisiin ihmisiin.	8	12	31	25
On aggressiivinen vieraille ihmisille.	1	2	5	67
Suhtautuu ystävällisesti kaikkiin koiriin.	32	30	17	4
Suhtautuu aggressiivisesti omaa sukupuoltaan oleviin koiriin.	3	8	23	43
Suhtautuu aggressiivisesti kaikkiin koiriin.	3	0	18	54
Sopeutuu nopeasti uusiin tilanteisiin.	39	34	8	2
Palautuu hitaasti ennalleen yllättävien tilanteiden jälkeen.	6	12	22	34

Laumakäyttäytyminen: sopeutuu helposti laumaan.	31	32	12	2
Ongelmia hoitotoimenpiteissä kotona kuten kynsien leikkaamisessa.	5	14	24	35
Ongelmia eläinlääkärin normaaleissa hoitotoimenpiteissä (ei koske kiputiloja).	2	6	13	55

Tiibetinspanielin ääniherkkyys

Ääniherkkyttä koskevaan kysymykseen tuli 39 vastausta niiden tiibetinspanieleiden osalta, jotka elävät ainoina koirina ja 67 vastausta niiden osalta, jotka elävät kahden tai useamman koiran laumassa . Osassa vastauksista todettiin, että ääniherkkyttä ei ole ollut. Joistakin vastauksista oli tulkittavissa, että kysymys oli normaalista vahtimisesta, rodulle tyypillisestä käyttäytymisestä sen ilmoittaessa esimerkiksi vieraista, toisista koirista tai ohikulkijoista, tai vartioidessa pihamaalla.

Varsinainen ääniherkkyys eli selkeä pelko tuli esille 22 vastauksessa ainoina koirina elävien osalta ja 34 vastauksessa niiden osalta, jotka elävät kahden tai useamman koiran laumassa . Ääniherkkyttä aiheuttavat ukonilma, ilotulitus, remontointimelu, sade, tuuli, kerrostalon äänet, hälytysajoneuvojen äänet tai muut voimakkaat äkilliset äänet, mutta myös kodinkoneiden normaalit äänet. Ääniherkkyys ilmenee säpsähtelynä, läähätyksenä, sykkeen nousuna, levottomuutena, varautuneisuutena, tärinänä, ovien raapimisena tai paikkojen tuhoamisena ja pyrkimyksenä piiloutua tai olla mahdollisimman lähellä omistajaa.

Tiibetinspanielin eroahdistus


Eroahdistusta koskevaan kysymykseen tuli 19 vastausta niiden tiibetinspanieleiden osalta, jotka elävät ainoina koirina ja 29 vastausta niiden osalta, jotka elävät kahden tai useamman koiran laumassa. Osassa vastauksista ilmoitettiin, että eroahdistusta ei ole ollut.

Eroahdistusta oli ollut 9:llä ainoina koirana elävällä ja 15:llä laumassa elävällä koiralla. Eroahdistus on tullut esiin tilanteissa, joissa koira on jäänyt yksin, joko ilman toista koira tai perheenjäsentä. Eroahdistus ilmenee haukkumisena, vinkumisena, kuolaamisena, oven raapimisena, esineiden ja huonekalujen tai seinien pureskelemisena ja repimisenä, virtsaamisena tai ulostamisena.

Joissakin tapauksissa eroahdistusta oli hoidettu eläinlääkärin ohjauksessa tai koira-asiantuntijalta.


Osa 2 Silmien ja hampaiden terveys

Silmät



40 % Ei-vastauksia = 124 tiibetinspanielia 60 % Kyllä-vastauksia = 186 tiibetinspanielia


Kyselyssä kysyttiin myös silmätutkimustulosta. Kysymykseen saatiin 182 vastausta. Suurimmalla osalla silmät oli todettu tutkimuksessa terveiksi. Yleisin ongelma olivat ylimääräiset ripset (distichiasis ja ektooppinen cilia), jotka oli mainittu lähes 30 vastauksessa. Lisäksi oli mainittu caruncular trichiasis, jossa naaman karvat hankaavat silmän sisänurkkaa. Muutamia silmäluomen sisäänpäin kiertymiä sekä kaiheja oli myös mainittu. Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä on mahdollista tutkia tarkemmin silmätutkimusten tuloksia kaikkien silmätutkimusten osalta.



27 % PRA3-vapaa esivanhempiensa geenitestituloksen perusteella = 80 tiibetinspanielia, 28 % PRA3-vapaa oman geenitestituloksensa perusteella = 81 tiibetinspanielia, 4% PRA3-kantaja = 11 tiibetinspanielia, 41 % Ei tiedossa [PRA3-status] = 119 tiibetinspanielia

PRA3- sairaita ei kyselyn vastausten joukossa ollut.

Silmien terveydestä ja todetuista sairauksista tai ongelmista kysyttiin erillisellä kysymykselläkin. Luvut kuvassa ovat tapausten lukumääriä.




Lisätietoja -kohdassa tuotiin esiin seuraavia asioita (26 vastausta):


- Neljällä tiibetinspanielilla 'cherry eye' eli vilkkuluomen esiinluiskahdus oli ilmennyt pentuikässä, mutta ei sen jälkeen. Lisäksi kolmelta se oli leikattu alle 1-vuotiaana.
- Silmävuotoa esiintyi paitsi ylimääräisten ripsien ja hankaavien naaman karvojen vuoksi myös allergian, tuulen, siitepölyn, katupölyn tai pakkasen vuoksi. Myös kyynelkanavien ongelmat tulivat esiin.
- Keratiittia ja haavaumia esiintyi parissa tapauksessa.
- Tapaturmia oli muutamia tapauksia, esimerkiksi tappelu tai oksan raapaisu.

Hampaat


Kyselyssä 305 tiibetinspanielin hampaat oli laskettu 128:lta (42 %) ja laskematta 177 :lta (58 %).




Tässä kohdassa oli ilmoitettu myös, että hampaita puuttuu, määrä on normaali ja ettei vastaaja tiennyt tarkkaan, montako hammasta koiralla oli.




Muutamissa vastauksissa oli ainoastaan maininta, ettei hampaiden määrästä ollut tietoa.




Osalta kuusihampaisista oli alaeuhampaita irronnut vanhemmiten, mutta tässä lukumääränä on niilläkin alkuperäinen kuusi. Yhdellä hampaat olivat vasta tulossa, ja yhden hampaiden lukumäärästä ei ollut tietoa.



7 % Kyllä -vastauksia = 21 tiibetinspanieliä 93 % Ei -vastauksia = 280 tiibetinspanieliä




36 % Kyllä-vastauksia = 111 tiibetinspanieliä 64% Ei-vastauksia = 195 tiibetinspanieliä



6 % Kyllä -vastauksia = 18 tiibetinspanieliä 94 % Ei-vastauksia = 277 tiibetinspanieliä

Puhkeamattomat hampaat ovat olleet


- välihampaita eli premolaareja 14 tapauksessa (61 %)
- etu-, kulma- tai poskihampaita 10 tapauksessa (39 %)



5 % Kyllä -vastauksia = 13 tiibetinspanieliä 95 % Ei-vastauksia = 241 tiibetinspanieliä

Kystan toteamisikä vaihteli yhdestä kymmeneen ikävuoden välillä, eikä tyypillistä ikää ollut (13 vastausta).


KOIRALTA ON IRRONNUT TAI SILTÄ ON JOUDUTTU POISTAMAAN PYSYVIÄ
HAMPAITA 298 vastausta



34 % Kyllä-vastauksia = 100 tiibetinspanielia 66% Ei-vastauksia = 198 tiibetinspanielia

KUINKA MONTA PYSYVÄÄ HAMMASTA ON IRRONNUT TAI
JOUDUTTU POISTATTAMAAN ?


107 vastausta



Lisäksi kohdassa oli vastattu 'kaikki', 'muutamia' tai ei yhtään = 0.


PYSYVIEN HAMPaidEN POISTAMISEN TAI IRTOAMISEN SYY

98 vastausta



JOS KOIRALLE MUODOSTUU HAMMASKIVEÄ, KUINKA USEIN HAMMASKIVEÄ ON POISTETTAVA ELÄINLÄÄKÄRILLÄ

142 vastausta



30 % Kerran vuodessa = 42 tiibetinspanieliä, 35 % 2-3 vuoden välein = 50 tiibetinspanieliä, 19 % Harvoin/vain kerran = 27 tiibetinspanieliä 16% Ei koskaan = 23 tiibetinspanieliä.

Tiibetinspanieleiden hampaita hoidetaan kyselyn mukaan

- harjaamalla
- puruluilla
- oikeilla luilla
- Dentastixeillä ja
- merilevävalmisteilla (Plaque Off) sekä
- huolehtimalla hammaskiven poistoista.


Vastauksia oli tässä yhteensä 211, ja nämä menetelmät olivat selvästi yleensä käytössä.

Lisätietoja - kohdassa tuotiin seuraavia asioita hampaiden ja purentaan liittyen (65 vastausta):

- alapurenta (useita mainintoja)
- voimakas alapurenta (useita mainintoja)
- hampaiden epätasainen rivi (useita mainintoja)
- kapea alaleuka (muutamia mainintoja)
- hampaat ahtaasti suussa (muutamia mainintoja)
- parodontiitti (muutamia mainintoja)
- vino purenta (muutamia mainintoja)
- hampaiden heiluminen vanhemmiten
- ikenen liikakasvu
- hammaspuutoksia, kysta, kulmahampaiden poistaminen, ikenen avaaminen pysyvien hampaiden tieltä, hampaiden kuluminen
- kauniit hampaat, vähän hammaskiveä, hyvä purenta, suorat hammasrivit

Osa 3 Tulehdussairaudet, luusto, muut perinnölliset/synnyttäiset sairaudet

Tulehdussairaudet



Tämän kysymyksen vastauksissa tuli esiin myös

- anaalirauhasten täyttyminen (2 koiraa)
- närästys (2 koiraa)

- suun kasvaimet (2 koiraa)

sekä yksittäisinä vastauksina

- ihotulehdus korvalehdissä mahdollisesti leikin seurauksena
- autoimmuunisairaus
- idiopaattinen serebelliitti (pikkuaivojen autoimmuuni tulehdus)
- haimatulehdus.

Tulehdussairaudet vaikuttivat myös jonkin verran kasaantuvan joillekin tiibetinspanieleille: useita tulehdussairauksia oli sairastanut 30 tiibetinspanielia. Märkivää ihotulehdusta 'hot spottia', suolistotulehduksia, anaalirauhastulehduksia ja korvatulehduksia esiintyi yksinään, mutta näitä neljää tulehdussairautta esiintyi samalla koiralla useampia.


Kuudessa vastauksessa anaalirauhasten mainittiin puhjenneen, kolmelta ne oli leikattu, yhtenä syynä anaaliadenooma.

Luusto

Polvet

Kyselyn tiibetinspanieleista 184:lle oli tehty virallinen polvitutkimus (59 %) ja 127 tiibetinspanielin polvet oli tutkimatta (41 %).


Tutkimustulos kuviossa on tulkittu huonoimman polven mukaan.



Polvien uusintatutkimus oli tehty 28 tiibetinspanielille. Näistä 20 koiran tulos oli pysynyt samana, viiden parantunut ja kolmen huonontunut. Huonontuneissa tuloksissa kyse oli kahdesta koirasta, joiden tulos oli muuttunut 0-asteesta 1-asteeseen yli 8-vuotiaana.

POLVILUMPION SIJOILTAANMENO (PATELLA LUKSAATIO)

■ Ei / 273 vastausta ■ Kyllä / 15 vastausta




Patellaluksaatio oli leikattu kahdelta tiibetinspanielilta.

Lonkat

KOIRAN LONKAT ON KUVATTU


■ Ei / 248 vastausta ■ Kyllä / 60 vastausta



Virallinen lonkkatutkimustulos oli 48 tiibetinspanielilla, epävirallinen tulos oli 6:lla. Epävirallisia tuloksia ei ole huomioitu kuvassa. Kuvan lonkkatutkimustulos on tulkittu huonomman lonkan mukaan.

VIRALLINEN LONKKATUTKIMUSTULOS

■ A 11 koiraa ■ B 14 koiraa ■ C 20 koiraa ■ D 1 koira ■ E 2 koiraa



Kyselyn vastauksissa ei ollut yhtään Legg-Perthes -tapausta. Kyselyssä kuudella tiibetinspanielilla ilmoitettiin olevan lonkkaniveldysplasia. Yhden koiran lonkkaniveldysplasia oli vaatinut leikkauksen.

Kynnärnivelet

Kynnärnivelet oli kuvattu 11 tiibetinspanielilta. Näistä oli osteokondroosikuvauksia 8 ja inkongruessikuvauksia 4, eli yhden kynnärnivelet oli kuvattu molempien varalta.

Tulokset:

INC 0/0 3 koiraa, 1 / 2 yksi koira, jolla myös nivelrikkoa


OD 0/0 6 koiraa

Lisäksi oli kaksi epävirallista tulosta, joissa kuvaus oli tehty sairauden seuraamiseksi.

Selkä


KOIRALLA ON SELKÄKIPUJA, HEIKKOUTTA TAKARAAJOISSA, HALVAUSOIREITA

■ Ei 290 koiraa ■ Kyllä 20 koiraa



KOIRAN SELKÄ ON KUVATTU

■ Ei 282 koiraa ■ Kyllä 26 koiraa



Selkäkuvaustulos oli ilmoitettu 11 tiibetinspanielin kohdalla maininnalla puhdas, normaali tai koko lausuntona: VA0 (nikamien epämuotoisuus) SP0 (spondyloosi) LTV (välimuotoinen lanneristinikama). 0. Yhdellä tulos oli välimuotoisen lanneristinikaman osalta LTV1. Yhdellä oli lisäksi kalkkeutuneita välilevyjä 8 kpl, eli IDD3.


Epävirallisesti kuvattuja terveitä oli 5 tiibetinspanieliä, ja spondyloosi mainittiin 3 koiran kohdalla. Lisäksi yhden selkä oli magneettikuvattu halvausoireiden vuoksi.

Selän terveydestä erillisissä kysymyksissä saatiin vielä seuraavat tiedot:

- spondyloosi (6 koiraa /vastauksia 300)
- välimuotoinen lanneristinikama (2 koiraa/vastauksia 298)
- välilevyn pullistuma 'mäyräkoirahalvaus' (3 koiraa /vastauksia 308)

Välilevyn pullistuma oli leikattu vastausten mukaan yhdeltä koiralta, muilla johtanut lopetukseen.

Ontuminen



Ontumisen syitä (22 vastausta):


Nivelrikko (6) , patellaluksaatio (2), välilevytyrä niskassa (1), reisiluun pää poistettu, ell:n mukaan ei Legg-Perthes (1), lonkat (1), lihasten jumiutuminen (3), tapaturma (2), nivelongelmat (2), vanhuus (3)

Luuston terveys

Luuston terveyteen liittyvissä lisätiedoissa tuotiin esiin mm. seuraavia ongelmia:

- spondyloosi (4 koiraa)
- lonkkaniveldysplasia (3 koiraa)
- osteopaatin hoito: selän kipu, SI-nivelen löysyys (3 koiraa)
- välilevytyrä (2 koiraa)
- selän kiputilat (2 koiraa)
- vanhuuden luuston ja lihaksiston ongelmat (3 koiraa)
- niskanikaman virheasento
- kylkiluissa epämuodostumaa
- suora polvi ja kinner
- yliojentuva kinner ja polvi
- käyrät etujalat

Kasvaimet, syöpä




Joissakin tapauksissa koira oli sairastanut useampia kasvainsairauksia tai syöpiä.




Atopia, allergia

KOIRALLA ON ATOPIA



KOIRALLA ON ALLERGIA




Oireiden kuvauksia olivat ihon kuivuus, tassujen nuoleminen ja punoittaminen sekä vatsaoireet. Iho-oireisiin tarvittiin lääkitys tai ruokavalio. Yhdellä oireilua esiintyi kesä-syyskuussa.

Allergiaa aiheuttavina mainittiin seuraavia asioita:

- vehnä (4 koiraa)
- viljat, myös riisi (3 koiraa)
- siipikarja, kana (3 koiraa)
- naudanliha (2 koiraa)
- yleensä jokin ruoka-aine (2 koiraa)
- sianliha
- kala

VAKAVIA SISÄELINTEN/HERMOSTON PERINNÖLLISIÄ SAIRAUKSIA

306-309 vastausta



Maksasairaudessa kysymys oli maksakirroosista.


Munuaissairauksia sairastavien viiden koiran tietoja oli tarkennettu seuraavasti: 1) munuaisdysplasia, joka johti koiran kuolemaan 2) munuaisten vajaatoiminta 3) munuaiskivet 4) 11-vuotiaana munuaisruokavalio 5) pentuiän kohonnut munuaisarvot korjaantuneet.

Epilepsiaa sairastavien kuuden koiran tilanne oli vastausten mukaan seuraava: kolmella oli epilepsialääkitys, yhdellä oli ollut vain yksi kohtaus ja yhdellä kaksi kohtausta kahden vuoden välein ilman lääkitystä, yksi oli nukutettu kahden kohtauksen jälkeen, yhdellä kohtausta määrää ei oltu mainittu mutta lääkitystä ei ollut.

Sydänsairauksia esiintyi useimmiten iäkkäillä, vähintään yli 8-vuotiailla koirilla, useimmiten yli 10-vuotiailla:

- mitraaliläpän vuoto, läppävika yli 8-vuotiaana (6 koiraa)
- sydämen vajaatoiminta yli 10-vuotiaana (5 koiraa)
- sydämen laajentuma yli 9-vuotiaana (5 koiraa)
- sivuääni, ei lääkitystä
- sivuääni, lääkitys
- sivuääni, sydämessä reikä
- sydämen hidas rytmi

SYNNYNNÄISIÄ tai PERINNÖLLISIÄ VIKOJA 306-309 vastausta



Napatyrä oli leikattu 12 tiibetinspanielilta, lähes aina steriloinnin tai kastroinnin yhteydessä. Yhdellä koiralla suoli oli työntynyt napatyrään, jolloin leikkaus oli pakollinen.

Nivustyrä oli leikattu yhdeltä koiralta 1-vuotiaana, kolmella muulla nivustyrä oli tullut iäkkäänä, ja myös silloin leikattu.

Lisätietoja edellisiin liittyen:


Ahtaat sieraimet olivat ainakin kahdella koiralla kehittyneet normaaleiksi pentuiän jälkeen. Joillakin aiheuttivat tukkoisuutta, tai kuorsausta.

Yhdellä koiralla kynnet olivat hauraat, mutta SLO-diagnoosia ei ollut varma.

Yliojentuvien kintereiden ja polvien todettiin vaikeuttavan selkeästi koiran liikkumista.

Itsenäinen, älykäs, ystävällinen juuri sopivan kokoinen perhekoira

HANKKISITKO VIELÄ TIIBETINSPANIELIN KOIRAKSESI?



Suurin osa hankkisi tiibetinspanielin, ja kokemusta rodusta oli muutamilla yli 40 vuotta. Tiibetinspanielia kuvailtiin helppohoitoiseksi muutenkin kuin turkin osalta. Terveyttä ja pitkäikäisyyttä korostettiin useissa vastauksissa. Monelle rotu on juuri se ainoa ja oikea, sydämen koira. Lenkkeilykaveri, joka on viehättävä seuralainen.


Joku kuitenkin koki karvanlähdön haastavana, ja joku koki rodulla olevan paljon sairauksia ja ongelmia.

Kritiikkiä ja huolta kohdistui muutamassa vastauksessa kasvattajiin: koettiin, että rodusta, sen luonteesta tai terveydestä ei kanneta huolta, tai pentueita teetetään suuria määriä nopeassa tahdissa.

Osa 4 Lisääntyminen

Urosten lisääntyminen

Seuraavissa kuvissa luvut ovat vastausten lukumääriä.







Urosten lisääntymiskäyttäytymistä oli kommentoitu vain vähän avoimessa kysymyksessä, 15 kpl:

Viidessä vastauksessa tuotiin esiin, että uros oli innokas, mutta ei ollut vielä astunut. Muutamien kastrointia harkittiin seksuaalisen yliaktiivisuuden vuoksi. Luonnollisia astujia, joilla normaali sukupuolivietti, yksi pyörtyi astutuksessa. Ongelmina tuotiin esiin liian lyhyt siemenjohdin, yksi oli innokas, mutta astutus saattoi jäädä vaillinaiseksi. Yksi uros ei ollut kovin aktiivinen, vaan vaati avustusta ja yksi käyttäytyi arasti astutustilanteessa.


Nartujen lisääntyminen

Seuraavissa kuvissa luvut ovat vastausten/koirien lukumääriä.






Yksi nartuista oli astutettu kerran, mutta jäänyt tyhjäksi. Yhden nartun ainoan pentueen kaikki pennut olivat menehtyneet. Yhdelle vasta odotettiin ensimmäistä pentuetta.




Lisäksi yhdessä vastauksessa oli merkitty, että pentujen lukumäärästä ei ollut tietoa, kysymys lienee sijoitusnartusta.




Kahdella nartulla oli luonnollisen astutuksen lisäksi toinen maininta: luonnollinen astutus avustettuna ja keinosiemennys.


Yksi narttu oli keinosiemennetty tiinehtymisen varmistamiseksi.





SYNNYTYKSEN SUJUMINEN



KEISARINLEIKKAUKSEEN JOHTANEET SYYT 11 vastausta



Yhdessä vastauksessa oli mainittu sekä heikkopolttoisuus että pennun virheasento.




Pentujen kuoleman tai lopettamisen syitä oli kerrottu 29 avoimessa vastauksessa:

- Kehityshäiriö: kitalakihalkio, ei peräaukkoa, sulkeutumattomat vatsanpeitteet (6 vastausta)
- Kuolleena syntynyt (6 vastausta)
- Kuollut synnytyksessä: virheasento, istukan irtoaminen, pitkittynyt synnytys (5 vastausta)
- Liian alhainen syntymäpaino, alikehittyneisyys (3 vastausta)
- Pennun heikkeneminen/imemättömyys (3 vastausta)
- Vesipää (1 vastaus)
- Kohdun kiertymä: neljä menehtynyttä pentua (1 vastaus)
- Napatulehdus (1 vastaus)
- Nestettä keuhkoissa, keuhkoinfektio/Evira (2 vastausta)
- Emän alle jääminen (1 vastaus)

Kolme vastauksessa oli mainittu, että syystä ei ollut tietoa.

NARTUN PENTUEISSA ILMENNEET ONGELMAT 38 vastausta




Avoimessa kysymykseen saatiin 7 vastausta. Siinä tiedusteltiin vielä, mikä oli ollut ennen luovutusikää vakavasti sairastuneiden tai lopetettujen pentujen diagnoosi. Vastauksiin sisältyi myös useamman kuukauden ikäisiä pentuja.


- Synnynnäisesti alikehittynyt munuainen, mutta löydös ei täsmännyt PNP :hen.
- Munuaisdysplasia: pentu jouduttu lopettamaan 3 kuukauden ikäisenä ja pentu jouduttu lopettamaan n. 4 kuukauden ikäisenä
- Hyvin pienikokoinen verrattuna muihin pentuihin
- Kuvauksessa ja tutkimuksessa todettu erittäin huonot lonkat 9-viikkoisena
- Heikosti kasvaneista pennuista kaksi kuollut 6-viikkoisena, yhdellä kyynärnivelen epämuodostuminen.

Hoivakäyttämisen ja pentujen imettämistä koskevien kuvien lukemisessa on huomioitava, että 'ei koskaan' tarkoittaa nimenomaan kyseisen vaihtoehdon mukaista tilannetta. Emo, joka ei koskaan imetä pentuja 4-viikkoiseksi, todennäköisesti imettää ne vähintään luovutusikäen eli 5-7 -viikkoiseksi tai jopa pitempään.

EMON HOIVAKÄYTTÄYTYMINEN





PENTUJEN IMETTÄMINEN



Lisätiedoissa nartun lisääntymiseen liittyen kerrottiin voimakkaasta käytöksen muutoksesta juoksuaikoina ja voimakkaasta valeraskaudesta (1 vastaus). Lisäksi kerrottiin jatkuvista juoksuista, joista urokset eivät olleet kiinnostuneita (1 vastaus) ja emon kalkkikrampista pentujen ollessa viisivuikkoisia (1 vastaus). Pieneen pentueeseen pidettiin syynä myöhäistä astutusajankohtaa (1 vastaus). Yhdessä vastauksissa kerrottiin nartun olleen liian nuori synnyttämään.

Tiibetinspanieli on pitkäikäinen rotu

Kuviota varten tiibetinspanieleiden ikä on huomioitu sen mukaan, minkä ikävuosien väliin kyseisen koiran ikä asettuu, esimerkiksi 13 vuotta ja 2 kuukautta vanha tiibetinspanieli on 13-14 -vuotias. Ikäluokkia puuttuu, koska kyselyyn osallistuneiden omistajien koirissa niitä ei ollut



Jalostustoimikunnan puolesta
Anna-Maria Melkas

